

# Barn som anhöriga till patienter i vården- hur många är de?

**Anders Hjern**

barnläkare, professor

# Lagen om barn som anhöriga

*Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med*


- 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,*
- 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller*
- 3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.*

*Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.*


## **Studierna baseras på två olika analysmodeller och populationer :**

- Barn födda i Sverige 1987-89/1973-89 med uppföljning från födelsen till 18 års ålder.
- Alla folkbokförda barn (0-17 år) i Sverige 2006-2008.  
Här beräknades ett genomsnittligt värde per år med analys också av om barnet bor i samma hushåll som den aktuella föräldern.


***Procent av barn födda 1987-89 som har en pappa och/ eller mamma som vårdats inneliggande på sjukhus pga. missbruk och/eller psykisk sjukdom under deras barndom.***




***Procent av barn födda 1987-89 som har en pappa och/eller mamma som haft någon indikation i nationella register på riskbruk av alkohol och/eller narkotika.***




***Antidepressiv medicinering hos biologiska föräldrar under åren  
2006-8 i relation till barnets ålder det aktuella året. Årsincidens.***




***Andel av mödrar som vid ett givet inneliggande vårdtillfälle******2006-2008 bodde i samma hushåll som sina biologiska barn den******31 december föregående år.***

***Andel av fäder som vid ett givet inneliggande vårdtillfälle 2006-2008 bodde i samma hushåll som sina biologiska barn den 31 december föregående år.***







***Procent av barn födda 1973-89 som förlorade minst en förälder  
innan de fyllde 18 år efter dödsorsak.***



## *Barnets ålder vid faderns dödsfall efter dödsorsak.*



***Procent av barn födda 1987-89 som har en pappa och eller mamma som vårdats inneliggande på sjukhus i minst en vecka sammanhängande på grund av somatisk sjukdom, uteslutande missbruk***




# Socioekonomisk position (SEP)


Baserat på Hushållets SEI i Folk och  
Bostadsräkningen 1990

- **Hög**=Högre och medelhög tjänstemän
- **Medel**=Lägre tjänstemän och yrkesutbildade arbetare
- **Låg**=Outbildade arbetare
- **Oklassificerade**=Övriga


***Hushållets SEP i Folk och Bostadsräkningen 1990 och sjukhusvård på grund av alkoholmissbruk hos någon förälder hos barn födda i Sverige 1987-89, uppföljda till 18 års ålder.***




***Hushållets SEP i Folk och Bostadsräkningen 1990 och sjukhusvård på grund av narkotikamissbruk hos någon förälder hos barn födda i Sverige 1987-89, uppföljda till 18 års ålder.***



***Hushållets SEP i Folk och Bostadsräkningen 1990 och sjukhusvård på grund av psykisk sjukdom hos någon förälder hos barn födda i Sverige 1987-89, uppföljda till 18 års ålder.***




***Hushållets SEP i Folk och Bostadsräkningen 1990 och dödsfall hos någon eller bägge föräldrar hos barn födda i Sverige 1973-89, uppföljda till 18 års ålder (1/1000).***






***Hushållets SEP i Folk och Bostadsräkningen 1990 och dödsfall hos någon förälder pga våld eller olycka hos barn födda i Sverige 1973-89, uppföljda till 18 års ålder.***




## Relativ risk för eget narkotikamissbruk i åldern 15-35 år efter barndomens socio-ekonomiska position.

(Gauffin et al. *Addiction* 2013)




## Relativ risk för eget alkoholmissbruk i åldern 15-35 år efter barndomens socio-ekonomiska position.


*(Gauffin et al. JECH, in press)*




***Procent av barn födda 1987-89 i Sverige som har en pappa och eller mamma som vårdats inneliggande på sjukhus pga. alkohol missbruk under deras barndom efter ursprung***



***Procent av barn födda 1973-89 till mamma eller pappa som vårdats  
inneliggande på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk  
sjukdom som varit placerade i socialtjänstens dygnsvård.***



***Procent av barn födda 1973-89 till mamma eller pappa som vårdats  
inneliggande på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk  
sjukdom som varit placerade i socialtjänstens dygnsvård.***



# Barn som är placerade under lång tid (>5 år) i samhällsvård

- 34,9% förälder vårdad pga. alkohol
- 22,4% förälder vårdad pga. narkotika
- 38,5% förälder vårdad pga. psykisk sjukdom
- 61,6% någon av ovanstående

# Barn som är placerade under lång tid (>5 år) i samhällsvård

- 20,4% förlorar en förälder i dödsfall innan arton år
- Ytterligare 2,5% förlorar bägge föräldrarna



# Slutsatser

- Missbruk, sjukdom och död hos föräldrar varierar med familjens sociala status/utbildning:  
Ojämlighetsperspektivet viktigt!
- Barn i samhällsvård är en särskilt viktig målgrupp för insatser för barn som anhöriga.
- Beräkningar av hur många barn som berörs varierar med datakälla. Diskussion om prioriteringar behövs.
- Ytterligare analyser av barn till föräldrar med svåra fysiska sjukdomar angelägna.

# chess

Centre for Health  
Equity Studies



Tack för uppmärksamheten!

[anders.hjern@chess.su.se](mailto:anders.hjern@chess.su.se)



Stockholms  
universitet



Karolinska  
Institutet

*CHESS is a collaboration between Stockholm University and Karolinska Institutet.*